

Upprepad donation

Efter donationer av BM eller PBSC kommer det i ca 5-10% av fallen förfrågningar om huruvida givaren kan ge ytterligare celler. Att denna förfrågan kan komma skall givaren ha informerats om i samband med den första donationen. Erfarenheten är att stamcellsutbyte vid en andra skörd och upplevelse av denna inte skiljer sig från den första gången.

Den produkt som vanligen efterfrågas är ostimulerad leukaferes (DLI,) följt av PBSC och BM.

Allmänna riktlinjer

- Antalet donationer efter den initiala donationen är begränsad till två, varav stamcellsdonation (BM eller PBSC) endast kan utföras en gång till (i de fall man misslyckas med aferes av PBSC och gör BM skörd initialt eller att givaren ger PBSC i två dagar initialt räknas som en donation)

Varje förfrågan om förnyad donation skall godkännas av ansvarig läkare på Tobias registret innan förfrågan går till donatorn

Specifika krav för hematopoetiska stamceller (BM eller PBSC)

Antal tillåtna donationer: 1

Tidsintervall mellan initial donation och ny donation: minst 4 veckor

Tidsintervall mellan DLI och ny donation: minst 4 veckor

Normalt blodstatus (LPK, Hb, TPK, Lymfocyter $>1 \times 10^9/L$)

Specifika krav för ostimulerad leukaferes (DLI)

Antal tillåtna donationer:

Tidsintervall mellan initial donation och DLI: 4 veckor
Normalt blodstatus (LPK, Hb, TPK, Lymfocyter $>1 \times 10^9/L$)

Maximal celldos som kan begäras skall kunna skördas genom att max 4 blodvolymmer processas (beräknat på 60-70 ml/kg). Uppskattad mängd celler är 1×10^9 MNC/L processad blod

Specifika krav på helblodsgivning

Antal tillåtna donationer: två

Tidsintervall från initial donation och ny donation: 6 veckor efter BM och 2 veckor för PBSC

Normalt Hb

Andra typer av donationer

Förfrågningar om ytterligare donationer som inte uppfyller de riktlinjer som behandlas här kan accepteras i enskilda fall där ytterligare information inhämtats och ärendet behandlats i Tobias registrets rådgivande grupp.